

Príprava pred kolonoskopiou prípravkom MOVIPREP ak je Vaše vyšetrenie v čase od 7,30h. do 9,30h.

(e-recept Vám na požiadanie zašleme do lekárne):

- Pokiaľ užívate lieky, ktoré ovplyvňujú zrážanie krvi a obsahujú **kyselinu acetylsalicylovú, tiklopidín, klopidogrel, warfarín, dabigatran, rivaroxaban, apixaban** alebo iné, je dôležité, aby boli vysadené dostatočný čas pred vyšetrením. Niektoré lieky musia byť počas vysadenia **nahradené napríklad nízkomolekulárnym heparínom podľa Vášho internistu, kardiológa či hematológa.**
- Zrážanie krvi ovplyvňujú aj mnohé analgetiká, takzvané nesteroidné antireumatiká (ibuprofén, diklofenak a pod.), preto je potrebné ich vysadenie 7 dní pred výkonom
- **Vysadenie liekov, ktoré ovplyvňujú zrážanie krvi vždy konzultujte s Vaším internistom, kardiológom, hematológom či neurológom**

Ak si aplikujete nízkomolekulárny heparín (Fraxiparin, Fragmin, Clexane a iné), v deň výkonu si dávku nepodajte.

Doneste si sebou výsledky krvného obrazu a zrážanlivosti krvi INR a APTT. (nie staršie ako 7 dní)

Dôkladná príprava čreva je základným predpokladom úspešného vyšetrenia. Črevo musí byť maximálne vyprázdnené, aby lekár pri vyšetrení videl iba sliznicu čreva. Preto treba dodržať nasledovný postup.

5 dni pred vyšetrením ješ' iba bez zvyškov diéty **NEKONZUMOVAŤ**-zeleninu, ovocie s kôstkami resp. zrnčkami, celozrnné výrobky, cereálie (ovsené vločky, müsli) hovädzie a bravčové mäso.

MOŽETE konzumovať-biele pečivo, cestoviny, zemiaky, mliečne výrobky, jogurty, biele mäso (hydina, nemastné ryby)

2 dni pred vyšetrením už len kašovitá strava ako sú jogurt, krupicová, zemiaková kaša, mixované polievky z koreňovej zeleniny. Piť treba celý deň čire tekutiny – voda, nesýtená minerálka, bylinkový, ovocný čaj, bujón-čírý.

Deň pred vyšetrením kašovité raňajky (jogurt, krupicová kaša,...). Na obed len čistý vývar –bujón.

Príprava začína o 16,00 hod. pripravte si prvú dávku t.j. 1 liter roztoku MOVIPREP. MOVIPREP sa skladá z vrecka A+ B. Obe vrecka spolu rozpustíte v jednom litri vody a vypijete (rýchlosťou: 1liter za 1-2 hod.) + pol litra čistej neperlivej vody

O 19.00 hod. zopakujete to isté s druhým litrom roztoku MOVIPREPU. Obe vrecka A +B spolu rozpustíte v jednom litri vody a vypijete (rýchlosťou: 1liter za 1-2 hod.) + pol litra čistej neperlivej vody.

Dôrazne sa odporúča, aby ste v priebehu prípravy vypili ešte jeden liter čirej tekutiny čira polievka -bujón, jablkový džús bez dužiny, bylinkové, ovocné čaje a neperlivé minerálky.

Za dobre pripraveného Vás môžeme považovať vtedy, ak ku koncu prípravy z konečníka už neodchádza formovaná stolica, ale len "hnedá voda".

V deň vyšetrenia-ráno možno užiť lieky na srdce a tlak.

Pokiaľ uvažujete o utlmujúcej injekcii, tak v deň vyšetrenia prídete s osobou, ktorá Vás bude sprevádzať a zdrži sa u nás počas celej doby vyšetrenia.